

**РЕКОМЕНДАЦИИ**  
**по применению биологически активной добавки к пище**  
**«ЭПИГАЛЛАТ®»**  
**в капсулах по 500 мг**

**Свидетельство о государственной регистрации продукции:**  
**№ RU.77.99.11.003.R.003989.11.19 от 01.11.2019 г.**

**ТУ 10.89.19-001-79376760-2019**

**ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018).**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.C.31156.IS.FSMS.836 от 03.03.2021 г.**  
**до 03.03.2024 г.**

**СОСТАВ**

Лактозы моногидрат (носитель), крахмал картофельный, экстракт зеленого чая, капсула (желатин, красители: E171, E131, E172), целлюлоза микрокристаллическая (носитель, минеральный премикс: *железа лактат, лактоза (носитель), цинка сульфат, марганец сульфат, меди сульфат, йодид калия, селенит натрия*); магния стеарат (антислеживающий агент).

Не содержит ГМО.

**СВОЙСТВА КАТЕХИНОВ ЗЕЛЕННОГО ЧАЯ**

Катехины зеленого чая обладают множественным этиопатогенетическим действием в отношении гиперпластических процессов репродуктивной системы. Подавляют патологический рост и деление клеток в органах и тканях женской репродуктивной системы, обусловленные негормональными стимулами. Снижают инвазивную активность клеток эндометрия, а также вызывают избирательную гибель (апоптоз) клеток с повышенной пролиферативной активностью. Катехины зеленого чая обладают выраженным антиангиогенным действием (подавляют патологический рост новых сосудов) и, таким образом, препятствуют росту новообразований. Являются эффективным противовоспалительным средством, подавляя активность циклооксигеназы второго типа, простагландинов и синтез провоспалительных цитокинов, а кроме того, усиливают действие антибиотиков (тетрациклинов,  $\beta$ -лактамов) и повышают чувствительность резистентных микроорганизмов к действию антибактериальных агентов. Обладают выраженным антиоксидантным действием, нейтрализуя образование свободных радикалов.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника цинка, йода, железа, марганца, селена, меди, источника эпигаллокатехин-3-галлата. Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов ЕАЭС.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

**В суточной дозировке** (3 капсулы) содержится % от-рекомендуемого уровня суточного потребления: эпигаллокатехин-3-галлата 210\*\* % (210 мг)\*, железо 107\*\* % (15 мг), медь 99 % (0,99 мг)\*, йод 88 % (0,132 мг), цинк 58 % (8,7 мг), марганец 50 % (0,99 мг)\*, селен 94 % (0,066 мг).

\*адекватный уровень потребления

\*\*не превышает верхний допустимый уровень потребления

БАД Эпигаллат® рекомендован в сочетании с БАД Индинол® в комплексном терапевтическом лечении эндометриоза, аденомиоза, миомы матки и гиперплазии эндометрия без атипии, а также для профилактики рецидивов указанных заболеваний после хирургического лечения. Оказывает выраженное тормозящее действие на рецидивирование эндометриоидных кист яичников в послеоперационном периоде.

В составе комбинированной терапии (гиперплазия эндометрия без атипии, эндометриоз, аденомиоз, миома матки) Эпигаллат® рекомендуется принимать внутрь в сочетании с БАД Индинол® (1 капсула + 1 капсула) 3 раза во время еды в течение 2-3 недель.

**Сертификат соответствия № РОСС RU.31411.04ИВМ0.01.Н00188 с 04.12.2019 г. по 03.12.2022 г.**

Информация об эффективности БАД, вынесенная в рекомендацию по применению и на этикетку, подтверждена клиническими испытаниями на основании Отчета о проведении научно-исследовательской работы Московской Медицинской Академии имени И.М.Сеченова от 22.12.2009 г.

### **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**

По данным доклинического и клинического изучения, Эпигаллат® хорошо переносится, не оказывая в терапевтических дозах побочных эффектов.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, состояния, при которых противопоказаны препараты йода.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Лицам с заболеваниями щитовидной железы и принимающим препараты йода перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом-эндокринологом.

**Не является лекарственным средством.**

### **ФОРМА ВЫПУСКА**

Капсулы по 500 мг.

Капсулы в блистерах: от 10 до 20 капсул в блистере, от 1 до 6 блистеров в упаковке.

Капсулы в полимерных банках с крышкой по 30, 60, 90, 120 капсул в банке. Допускается упаковка банки в пачку потребительскую.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

### **СРОК ГОДНОСТИ**

2 года.

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

АО «МираксБиоФарма», РФ, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5.

Адрес производства: РФ, 141401, МО, городской округ Химки, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр.1.

**ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

ООО «Ацино Рус», РФ, 129110, г. Москва, проспект Олимпийский, дом 16, строение 5, этаж 5, помещение I, тел. +7 (495) 502-92-47.

E-mail: quality\_rus@acino.swiss, Medinfo\_rus@acino.swiss



**Медицинский директор  
ООО «Ацино Рус»**

\_\_\_\_\_ / Гостищева О.В.